

## 『日常診療に活かす 診療ガイドライン UP-TO-DATE 2018-2019』 お詫びと訂正

単行本『日常診療に活かす 診療ガイドライン UP-TO-DATE 2018-2019』におきまして、  
記載内容に誤りがございました。

p. 40 掲載「具体的処方」

誤

処方例	ポイント
	⋮
③デシコビ LT 1錠×1回/日 +テビケイ 50 mg×1回/日	③デシコビ LT: TAF 10 mg+FTC 200 mg。CCr<30 mL/分未満の患者には使用しない。B型慢性肝炎合併患者では本剤の投与中止により B型慢性肝炎が再燃するおそれがある。 テビケイ: DTG 50 mg。副作用が皆無というわけではない。 2錠×1回/日で食事と関係なく服用できる。
④デシコビ HT 1錠×1回/日, 食直後 +プレジコビックス 1錠×1回/日, 食直後	④デシコビ HT: TAF 25 mg+FTC 200 mg。CCr<30 mL/分未満の患者には使用しない。B型慢性肝炎合併患者では本剤の投与中止により B型慢性肝炎が再燃するおそれがある。 プレジコビックス: DRV 800 mg+cobi 150 mg。CYP3Aにより主として代謝される薬剤とは併用禁忌。下痢, 悪心などの消化管系の副作用がみられることがある。 2錠×1回/日を食中もしくは食直後に服用する。
	⋮

正

処方例	ポイント
	⋮
③デシコビ HT 1錠×1回/日 +テビケイ 50 mg×1回/日	③デシコビ HT: TAF 25 mg+FTC 200 mg。CCr<30 mL/分未満の患者には使用しない。B型慢性肝炎合併患者では本剤の投与中止により B型慢性肝炎が再燃するおそれがある。 テビケイ: DTG 50 mg。副作用が皆無というわけではない。 2錠×1回/日で食事と関係なく服用できる。
④デシコビ LT 1錠×1回/日, 食直後 +プレジコビックス 1錠×1回/日, 食直後	④デシコビ LT: TAF 10 mg+FTC 200 mg。CCr<30 mL/分未満の患者には使用しない。B型慢性肝炎合併患者では本剤の投与中止により B型慢性肝炎が再燃するおそれがある。 プレジコビックス: DRV 800 mg+cobi 150 mg。CYP3Aにより主として代謝される薬剤とは併用禁忌。下痢, 悪心などの消化管系の副作用がみられることがある。 2錠×1回/日を食中もしくは食直後に服用する。
	⋮

読者ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げますとともに、  
謹んで訂正させていただきます。

株式会社メディカルレビュー社 編集部